Seminario de Casos: Patología del Peritoneo y Retroperitoneo

**XXV Congreso de la Sociedad Española de Patología
(SEAP) - Zaragoza, Mayo 18-21, 2011.**

Saul Suster, M.D.

**Departamento de Patología
Medical College of Wisconsin
Milwaukee, WI, USA**

Caso 1

- **Historia Clínica:**

Una mujer de 54 años sin antecedentes clínicos significativos es atendida por menometrorragia. Se le practica una histerectomía con salpingo-ooforectomía bilateral por miomas uterinos. Al mismo tiempo, un CT scan abdominal descubre una masa retroperitoneal asintomática. Se practica una resección de la masa retroperitoneal al mismo tiempo.

Hallazgos Operatorios:

- Durante la cirugía, se extrae un útero agrandado que mide 13 x 10.5 x 6.5 cm y contenía múltiples miomas intramurales y subserosos. Al examen microscópico, los tumores todos correspondían a leiomyomas uterinos convencionales, sin actividad mitótica aumentada. La masa retroperitoneal mide 15 x 12 x 10.5 cm, estaba bien circunscrita y encapsulada y mostraba a la superficie de corte tejido blanco-grisáceo de consistencia firme.
-

Diagnostico:

1. Hemangiopericitoma maligno
  2. Tumor fibroso solitario
  3. Sarcoma sinovial monofasico
  4. Fibromixosarcoma de bajo grado
  5. Sarcoma del estroma endometrial
  6. Liposarcoma desdiferenciado
-

Diagnostico:

Hemangiopericitoma

Maligno

Historia Clinica Adicional:

- La paciente no recibió tratamiento adicional aparte de la cirugía, y se perdió al seguimiento. Doce años más tarde, fue ingresada nuevamente por la presencia de una masa en el ventrículo cardiaco derecho. Se practicó una resección quirúrgica de la masa intracardiaca.
-

Diagnostico Final:

- Sarcoma del estroma endometrial ectopico originandose en el retroperitoneo
-

Int J Gynecol Pathol. 1993 Oct;12(4):282-96.

Primary extrauterine endometrial stromal neoplasms: a clinicopathologic study of 20 cases and a review of the literature.

Chang KL, Crabtree GS, Lim-Tan SK, Kempson RL, Hendrickson MR.

Department of Pathology, Stanford University Medical Center, CA 94305.

Abstract

We present the results of a clinicopathologic study of 20 patients with primary extrauterine endometrial stromal sarcoma (ESS). The sites of the primary neoplasm and the number of patients with sufficient follow-up for survival analysis are as follows: ovary (three of four), fallopian tube (one of one), pelvic cavity (six of eight), abdominal cavity (five of six), and retroperitoneum (one of one). Evaluation of all patients included the mitotic index (MI) and cytologic atypia. Thirteen of the sixteen patients eligible for survival analysis had tumors with an MI < 10 and would be classified as low-grade stromal sarcomas in the Norris and Taylor scheme. Eight (62%) of the 13 had one or more relapses; of these, three died of disease at 35, 108, and 120 months, respectively, and another patient was alive with disease at 96 months. The other four patients who were treated after a relapse showed no evidence of disease after relapse at 36, 57, 63, and 146 months, respectively. Two of the 13 patients had tumor considered unresectable at the time of diagnosis; both died of disease at 5 and 10 months, respectively. Neither MI nor cytologic atypia were predictive of tumor recurrence or death from tumor. We also extracted clinical and morphologic data from all previous reports of primary extrauterine ESS, combined them with our 20 patients, and then compared the combined group with 17 cases of primary high-stage uterine ESS we presented in an earlier report. Not surprisingly, the behavior of the primary extrauterine ESS was more reminiscent of high-stage primary uterine ESS than low-stage primary uterine ESS.

- Solo 1 caso identificado en el retroperitoneo!
- Los casos ectopicos mostraron la tendencia a un compartimento mas agresivo comparados con los endometriales.

Diagnostico Diferencial:

- Hemangiopericitoma
  - Tumor fibroso solitario
  - Sarcoma sinovial
  - Leiomiosarcoma retroperitoneal
  - Liposarcoma desdiferenciado
  - Condorsarcoma mixoide
extraesqueletico
-

Hemangiopericitoma

- Hemangiopericitoma de tipo nasal
  - Hemangiopericitoma meningeo
  - Hemangiopericitoma lipomatoso
  - Hemangiopericitoma infantil
-

Fletcher CDM, Unni KK, Mertens F. WHO Classification of Tumors. Pathology & Genetics of Tumors of Soft Tissue and Bone, 2002.

Diagnostico Diferencial:

Tumor	Caracteristicas	IHQ
<i>Sarcoma del Estroma Endometrial</i>	<i>Celulas pequeñas redondas y ovaladas sin atipia celular</i>	<i>CD10+ ER/PR+ Bcl-2+</i>
<i>Tumor Fibroso Solitario</i>	<i>Celulas fusiformes u ovaladas con abundante esclerosis estromal</i>	<i>CD34+ Bcl-2+/CD99+ CD10+ (50%)</i>
<i>Sarcoma Sinovial Monofasico</i>	<i>Celulas fusiformes o redondas con atipia celular y marcada actividad mitotica</i>	<i>CK/EMA + Bcl-2/CD99+</i>
<i>Liposarcoma Desdiferenciado</i>	<i>Areas de liposarcoma preexistente bien diferenciado</i>	<i>MDM2+ VIM+</i>
<i>Condrosarcoma mixoide extraesqueletico</i>	<i>Areas mostrando diferenciacion osteo-cartilaginosa</i>	<i>VIM+ CD99+</i>

Distinction of endometrial stromal sarcomas from “hemangiopericytomatous” tumors using a panel of immunohistochemical stains.

Bhargava R, Shiua J, Hummer AJ, Thaler HT, Tornos C, Soslow RA.

Modern Pathology 18:40-47, 2005.

- **Sarcoma del Estroma Endometrial:** CD10+, ER/PR+, Bcl-2+, SMA+, CK-AE1/3+, CD34(-)
  - **Hemangiopericytoma/Tumor Fibroso Solitario:** CD10+ (50%), PR+ (50%), ER (-), CD34+ (100%), Bcl-2+ (100%)
  - **Sarcoma Sinovial:** CK AE1/AE3+, Bcl-2+, PR+ (30%), CD10(-), CD34(-)
  - Recomendacion: Los anticuerpos mas utiles para diferenciar entre estos 3 tumores son: CD10, ER y CD34:
    - *CD10+, ER+, CD34(-) = Sarcoma del estroma endometrial*
    - *CD10+, ER+, CD34+ = Tumor fibroso solitario*
    - *CD10-, ER-, CD34-, Ker+ = Sarcoma sinovial*
-

Molecular detection of JAZF1-JJAZ1 gene fusion in endometrial stromal neoplasms with classic and variant histology: evidence for genetic heterogeneity.

Huang HY, Ladanyi M, Soslow RA.

Am J Surg Pathol 28:224-232, 2004.

- Translocacion (7;17)(p15;q21) se observa en SEE clasicos
- La translocacion resulta en la fusion de 2 genes: JAZF1 con JJAZ1
- La translocacion con la fusion de genes se observa de manera constante en los casos intrauterinos con morfologia clasica
- La fusion no fue detectada en los casos que no mostraban histologia clasica o en casos extrauterinos.
- Los autores concluyeron que los tumores del estroma endometrial pueden ser geneticamente heterogeneos

---

Caso 2

- **Historia Clínica:**

Una mujer de 56 años sin antecedentes particulares se presenta a la consulta con dolor en region lumbar. Una ecografia seguida de CT scan demuestra una masa retroperitoneal bien circunscrita de 13 cm. de diametro mayor localizada en la pelvis retroperitoneal. Al examen fisico y radiografico, no se encuentra un proceso neoplasico en ningun otro organo del cuerpo. Se procede a practicar una reseccion quirurgica de la lesion.

Diagnostico:

1. Schwannoma
  2. Perineurioma reticular
  3. Tumor fibroso solitario
  4. Leiomiosarcoma
  5. GIST
  6. Sarcoma miofibroblastico de bajo grado
-

SMA

CD34

S-100

Ker

CD117

Diagnostico:

Leiomioma
Retroperitoneal de Bajo
Grado

Historia Clinica Adicional:

- Al interrogatorio, la paciente declara una historia de histerectomía hace 12 años por “fibromas” uterinos. No se pudo revisar las láminas histológicas de la cirugía previa realizada en otro hospital, pero el reporte histopatológico indicó que se trataban de leiomiomas uterinos convencionales, algunos pedunculados y adheridos a la serosa del útero.
-

Bcl-2

Diagnostico:

- Leiomioma retroperitoneal retiforme, probablemente originandose como tumor parasitico en serosa del utero, y luego desplazado al retroperitoneo pelvico.
-

Retroperitoneal Leiomyomas

A Clinicopathologic and Immunohistochemical Study of 56 Cases With a Comparison to Retroperitoneal Leiomyosarcomas

Edina Paal, M.D., and Markku Miettinen, M.D., Ph.D.

- Estudio de 56 casos de tumores musculares benignos de retroperitoneo
- Pelvis retroperitoneal es la localización más frecuente de los leiomiomas retroperitoneales (73%)
- Ausencia de atipia o necrosis tumoral, y <1 mitosis X 50 campos de alto aumento
- IHQ: positividad para SMA, DES, y ER/PR – MIB-1 index $<10\%$
- 2 pacientes mostraron recurrencia local a pesar de características morfológicas “blandas”

Retroperitoneal Leiomyomas

Paal E, Miettinen M.

Am J Surg Pathol 25:1355-1363, 2001.

- “Debido a que los criterios diagnosticos, incluyendo indice de mitosis, son diferentes para tumores de musculo liso uterinos y extrauterinos, es de importancia establecer si un tumor de musculo liso retroperitoneal es de origen uterino o no. La presencia de tan solo 1 mitosis seria suficiente para declarar a un tumor de estirpe de musculo liso como maligno en localizacion retroperitoneal”.
-

The spectrum of Bcl-2 oncoprotein reactivity in benign and malignant spindle cell tumors of soft tissue, skin, serosal surfaces, and gastrointestinal tract. An immunohistochemical study of 380 cases.

Suster S, Fisher C, Moran CA.

Am J Surg Pathol 22:863-872, 1998.

- Estudio de 380 tumores de células fusiformes, incluyendo sarcoma sinovial, tumor fibroso solitario, GIST, sarcoma miofibroblástico, fibrohistiocitoma maligno, sarcoma de Kaposi, tumores de vaina nerviosa periférica y tumores de fibra lisa muscular uterinos y extrauterinos....
  - Todos los casos de tumores musculares de útero fueron positivos para el bcl-2
  - Todos los casos de tumores musculares primarios extrauterinos fueron negativos para el bcl-2
-

Diagnostico Diferencial:

- Schwannoma
  - Tumor fibroso solitario
  - GIST
  - Sarcoma miofibroblastico de bajo grado
  - Angiomiolipoma retroperitoneal celular
  - Perineurioma reticular
-

DD: GIST

- Tumor estromal gastrointestinal (GIST) en retroperitoneo puede ocurrir como resultado de invasión de un tumor abdominal, como primario extragastrointestinal (E-GIST), o debido a metastasis de GIST abdominal
  - GIST primario retroperitoneal tiene el mismo pronostico que su contrapartida originandose en tracto digestivo
  - Aspecto histologico puede variar de tumores fusocelulares de aspecto blando a tumores altamente celulares con marcada actividad mitotica y necrosis
  - IHQ: C-Kit+, DOG1+, CD34+, Bcl-2+; negativo para la mayoría de marcadores musculares
-

Extragastrintestinal (soft tissue) stromal tumors: an analysis of 48 cases with emphasis on histologic predictors of outcome.

Reith JD, Goldblum JR, Lyles RH, Weiss SS.

Modern Pathology 13:577-585, 2000.

- Estudio de 48 tumores en partes blandas abdominales no asociadas al tracto gastrointestinal
  - 8 pacientes presentaron con tumores primarios en retroperitoneo
  - Predominio en mujeres adultas sin historia previa de malignidad
  - Tamaño de la lesión varía de 9-32 cm de diámetro
  - La mayoría de los tumores mostraron baja celularidad con actividad mitótica baja (1-2 mitosis por 10 CAA)
  - La mayoría de los pacientes estaban vivos sin evidencia de enfermedad entre 1-6 años de seguimiento clínico
  - Similar perfil inmunofenotípico que los GIST intestinales
-

DD: Tumor Fibroso Solitario

- También pueden ocurrir en localización retroperitoneal
  - Pueden mostrar cambios mixoideos prominentes en el estroma
  - Pueden mostrar actividad mitótica baja (<3 mitosis por 10 campos de alto aumento)
  - Pueden mostrar áreas alternantes de hipo/hipercelularidad con esclerosis y hialinización estromal
  - IHQ: CD34+, Bcl-2+, CD99+
  - Los tumores son uniformemente negativos para marcadores musculares (actina/desmina)
-

DD: Tumores Neurales

- Schwannomas, neurofibromas y perineuriomas (y sus variantes malignas) pueden presentarse como tumores primarios de retroperitoneo
  - Los patrones de crecimiento, especialmente en schwannomas y perineuriomas pueden mostrar un prominente aspecto retiforme y mixoideo
  - Los tumores de vaina nerviosa periférica (schwannoma, neurofibroma) muestran fuerte positividad para la proteína S-100
  - Los tumores perineuriales muestran fuerte positividad para el EMA
-

DD: Angiomiolipoma Celular

- Angiomiolipoma renal celular puede presentarse como una masa retroperitoneal compuesta de células fusiformes
- El componente adiposo y vascular puede ser muy sutil o escaso
- Los tumores van a teñir positivamente con marcadores musculares (actina, miosina)
- Las células tumorales generalmente son positivas para marcadores melanocíticos, especialmente HMB45, melan-A, y el factor de transcripción de microftalmia
- Prominencia de células epitelioides perivasculares deberían hacer pensar en este diagnóstico

---

Caso - 3

- **Historial Clínica:**

Una mujer con antecedentes de enfermedad coronaria y mastectomía por carcinoma infiltrante intraductal hace 7 años se presenta a la consulta por cansancio, malestar general y dolor de espalda. Al CT scan, se observa una masa discreta en el retroperitoneo sin compromiso de riñón, páncreas o adrenales. Al estudio clínico y radiológico, no se encuentra evidencia de enfermedad en ningún otro órgano. Se practica una resección quirúrgica de la masa retroperitoneal.

Macroscopia:

- La tumoracion media 5.5 x 4.5 x 4 cm. y estaba bien circunscrita pero no-encapsulada. A la superficie de corte mostraba tejido solido y firme de coloracion blanca grisacea con focos de hemorragia.
-

Diagnostico:

- 1) Metastasis de carcinoma de celulas claras renales
  - 2) Metastasis de carcinoma de ovario de celulas claras
  - 3) Restos de adrenal
  - 4) Tumor de celulas mio-melanociticas (PEComa)
  - 5) Sarcoma alveolar de partes blandas
  - 6) Metastasis de carcinoma mamario de celulas claras
-

SMA

HMB45

CK - AE1/3

Diagnostico:

PEComa

(Tumor de células claras
extrapulmonar)

(Tumor mio-melanocítico de
partes blandas)

Perivascular Epithelioid Cell (PEC)

Bonetti et al 1992.

- Clear cell “sugar” tumor de pulmon
  - Angiomyolipoma
  - Lymphangioliomyomatosis
  - Tumor de células claras de azúcar extrapulmonares
-

PEComa:

- Utero
- Ligamento falciforme
- Intestino grueso y delgado
- Páncreas
- Corazón
- Tracto genitourinario
- Piel
- Mama
- Tejidos blandos

Perivascular Epithelioid Cell Tumor (PEComa) of Abdominal Origin: Report of 3 cases.

Cantu de Leon D, Perez-Montiel D, Bandera A, Villegas C, Gonzalez-Conde E, Bornstein Quevedo L, Chanona-Vilchis J.

Annals of Diagnostic Pathology (In-press, 2011).

- 3 casos que ocurrieron en pelvis y retroperitoneo
  - Mujeres de 38-76 años de edad
  - Tamaño del tumor: 7-15 cm. diametro
  - 1 caso bien circunscrito; 2 tumores infiltrativos
  - Histologia blanda sin atipia celular, baja actividad mitotica (1 mitosis por cada 30 campos de alto aumento), ausencia de invasion vascular
  - Seguimiento clinico: 12-18 meses sin evidencia de enfermedad
-

PEComa:

- Afectan predominantemente a mujeres (6:1) de mediana edad (edad promedio= 40 años)
  - El termino de “Tumor Mio-Melanocitico” ha sido propuesto por A. Folpe y su grupo para designar estas lesiones
  - Los tumores han sido divididos en base a su potencial biologico en:
    1. Tumores miomelanociticos benignos (<5 cm, sin atipia)
    2. Tumores de potencial maligno incierto (>5 cm, pleomorfismo nuclear pero sin necrosis, mitosis o invasion)
    3. Tumores malignos (>5 cm, atipia citologica, necrosis, infiltracion, actividad mitotica aumentada)
-

PEComa:

- Celulas grandes, claras o eosinofilicas
  - Celulas fusiformes
  - Patron vascular prominente
  - Amplio rango de atipia citologica, pero predominantemente compuesto de celulas sin atipia
  - M.E.: abundante glycogeno, cuerpos densos y premelanosomas
-

PEComa – IHQ:

- Coexpresión de actina y HMB45/Melan-A es indispensable para el diagnóstico
- Pueden mostrar expresión variable para otros marcadores melanocíticos, incluyendo la proteína S-100, tirosinasa y el factor de transcripción de microftalmia (MTF)
- Pueden mostrar positividad para otros marcadores musculares como la miosina de músculo liso (SMMS) y la calponina
- La mayoría de los tumores son negativos para la desmina, citoqueratina, cromogranina, sinaptofisina, CD10, CD34, y bcl-2
- Algunos tumores pueden mostrar positividad focal para CD117 y positividad artefactual con CD1a
- Dos marcadores adicionales demostrados en estos tumores son la Catepsina-K y el marcador TEF3

Genetica en PEComa

- Expresion de C-Kit ha sido reportada en casos de PEComa y angiomiolipoma
  - Perdidas de cromosomas 19, 16p, 17p, 1p, 18p
  - Ganancias en cromosomas X, 12q, 3q, 5 y 2q.
  - Alteraciones cromosomicas recurrentes han sido observadas en tumores renales y extrarenales
  - Fusiones del gen FTE3 han sido demostradas en algunos PEComas por Argani (Am J Surg Pathol 34:1395-1406, 2010)
-

Comportamiento Biologico

- La gran mayoría son benignos
- Algunos pueden ser agresivos:
  - Tamaño >5 cm. de diametro
  - Mitosis >1 X 50 HPF
  - Focos de necrosis
  - Invasión vascular
  - Infiltración
  - Atipia citológica marcada

Diagnostico Diferencial

- Metastasis de carcinomas de celulas claras
  - Leiomiomas/leiomiosarcomas epitelioides de celulas claras
  - Sarcoma de celulas claras de tendones y aponeurosis
  - Sarcoma alveolar de partes blandas
-

Tumor de partes blandas, muslo, V.39

Diagnostico Diferencial

Tumor	IHQ	Genetica
PEComa	<i>HMB45⁺ SMA⁺</i>	<i>Reordenamiento de genes TEF3 por FISH</i>
Clear Cell Sarcoma	<i>HMB45⁺, S100⁺, Melan A⁺ SMA⁻</i>	<i>Producto de fusion EWSR1/ATF1 del T(12;22)(q13;q12)</i>
Alveolar Soft Parts Sarcoma	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>
Metastatic Clear Cell Carcinoma	<i>Ker⁺, EMA⁺ HMB45⁻, SMA⁻</i>	<i>N/A</i>

Conclusion:

- PEComa debería ser considerado en el diagnóstico diferencial de tumores compuestos de células redondas/fusiformes con citoplasma claro en cualquier localización
  - Tumores HMB45/SMA-positivos y queratina negativos deberían ser considerados dentro de este diagnóstico
  - El tumor es de muy amplia distribución – debe ser SIEMPRE incluido en el diagnóstico diferencial de tumores de células claras!
-

Caso 4

- **Historia Clínica:**

Una mujer de 62 años de edad sin ningunos antecedentes clínicos significativos fue atendida por dolor lumbar y pérdida de peso. Al CT scan se le detectó una masa retroperitoneal bien definida que mostraba compresión de la vena cava inferior. No se observó ninguna otra alteración en otros órganos. Se practicó una resección quirúrgica completa de la masa retroperitoneal.

Diagnostico Diferencial:

1. Fibrohistiocitoma maligno pleomorfico
  2. Tumor fibroso solitario maligno
  3. GIST esclerosante maligno
  4. Esclerosis retroperitoneal con celulas bizarras
  5. Liposarcoma pleomorfico esclerosante
pobrememente diferenciado
  6. Fibrosarcoma esclerosante pleomorfico
-

MDM2

MDM2 amplification by FISH

Diagnostico:

Liposarcoma Pleomorfico

Esclerosante Pobrememente

Diferenciado

Sclerosing poorly differentiated liposarcoma: clinicopathological, immunohistochemical and molecular analysis of a distinct morphological subtype of lipomatous tumour of soft tissue

S Suster & C Morrison¹

Department of Pathology, the Medical College of Wisconsin, Milwaukee, WI and ¹Department of Pathology, Roswell Park Cancer Institute, Buffalo, NY, USA

Date of submission 11 May 2007
Accepted for publication 7 August 2007

Histopathology Vol.52:283-293, 2008.

- Estudio de 8 casos de tumores de partes blandas profundas
- Pacientes eran hombres y mujeres adultos entre 39-90 años de edad (edad promedio: 63 años)
- Dos casos estaban localizados en el retroperitoneo
- Tamaño del tumor: 4-30 cm diametro (promedio: 16 cm)
- Comportamiento agresivo con muertes debido a metastasis pulmonares entre 1-6 años

---

Liposarcoma Esclerosante Pobrementemente Diferenciado

- 4 casos se originaron como tumores *de-novo*
  - 4 casos se presentaron como recurrencias locales de sarcomas previamente resecados
  - Se observaron areas focales de transicion con elementos bien diferenciados, incluyendo lipoma-like liposarcoma, y liposarcoma desdiferenciado de bajo grado
  - En 3 casos, las areas pobremente diferenciadas mostraban transiciones con areas mixoides que semejaban liposarcoma mixoide
-

Liposarcomas con Esclerosis

- Variante esclerosante de liposarcoma: tumor bien diferenciado con areas de lipoma-like liposarcoma conteniendo areas focales de esclerosis estromal con celulas lipoblasticas atipicas
- Liposarcoma pleomorfico de alto grado: tumor pobremente diferenciado muy celular compuesto de lipoblastos bizarros y pleomorficos desprovistos de estroma que semejan FHM
- Tumor compuesto de celulas lipoblasticas bizarras y altamente pleomorficas empotradas en abundante estroma esclerosado y fibrotico --- ??????

Liposarcoma Pleomorfo Esclerosante

- IHQ en las células tumorales pleomorfas:
    - > Proteína S-100 negativa
    - > SMA, Bcl-2, CD34, CK – negativas
    - > MIB-1: positividad nuclear en >50% de células tumorales
    - > Positividad nuclear para el marcador MDM2
  - Hallazgos Moleculares:
    - > Amplificación de alto nivel del locus del gen *MDM2* en 4/7 casos estudiados usando FISH
    - > Ausencia de translocaciones del gen *CHOP* en 7/7 casos
-

Liposarcomas

- Bajo Grado:
  - Tumor lipomatoso atipico (lipoma-like liposarcoma)
  - Liposarcoma mixoide
- Grado Intermedio:
  - Liposarcoma desdiferenciado de bajo grado
  - Liposarcoma mixto de celulas redondas y mixoideo
- Alto Grado:
  - Liposarcoma desdiferenciado de alto grado
  - Liposarcoma de celulas redondas
  - Liposarcoma pleomorfico

Cambios Geneticos en Liposarcoma

- Translocacion de (12;16)(q13;p11) entre el producto de transcripcion *DDIT3* (tambien conocido como *CHOP*) con el gen *FUS* en liposarcoma mixoide
- Translocacion de (12;22)(q13;q12) entre *DDIT3* y el gen *EWS* en liposarcoma mixoide
- Cromosomas gigantes y de anillo supernumerario estan asociados con liposarcomas bien diferenciados y desdiferenciados
- Estas alteraciones se asocian con amplificacion de la region 12q13-q15, que incluye al gen *MDM2* y *CDK4*

Amplificación del *MDM2*

- Amplificación del MDM2 se ha observado en:
    - > Liposarcoma bien-diferenciado (lipoma-like liposarcoma)
    - > Liposarcoma desdiferenciado de bajo y alto grado
    - > 1/3 de liposarcomas pleomorficos
  - Debido a la presencia de amplificación del MDM2 y de la presencia de áreas de liposarcomas bien diferenciados y desdiferenciado de bajo grado interpretamos estos tumores como un estadio final de desdiferenciación con esclerosis originándose en tumores lipomatosos bien diferenciados
-

Diagnostico Diferencial:

- Fibrohistiocitoma maligno (sarcoma pleomorfico de alto grado)
  - Liposarcoma desdiferenciado de alto grado
  - Sarcomas de alto grado con esclerosis inducida por radioterapia
  - Fibrosarcoma epitelioides esclerosante
  - GIST con celulas pleomorficas y esclerosis
-

DD: FHM

- Fibrohistiocitoma maligno con esclerosis no debería de mostrar células con características de lipoblastos
  - Se requiere un extenso muestreo de la lesión para descartar áreas de liposarcoma de bajo grado bien diferenciado (lipoma-like liposarcoma o liposarcoma dediferenciado de bajo grado)
  - Fibrohistiocitoma maligno no debería mostrar alteraciones genéticas con amplificación del gen *MDM2*
-

DD: Liposarcoma Desdiferenciado de Alto Grado

- Liposarcoma desdiferenciado de alto grado tambien puede mostrar areas de esclerosis estromal
  - Las celulas malignas pleomorficas en el componente desdiferenciado de liposarcoma no deben mostrar diferenciacion adipocitica ni caracteristicas de lipoblastos
  - Por definicion, el componente desdiferenciado de alto grado en los liposarcomas desdiferenciados son de tipo no-lipogenico
-

Preguntas?